

Инструкция

по применению ветеринарного препарата «Раствор Рингер-Локка для инъекций»

Общие сведения

1.1 « Раствор Рингера-Локка для инъекций» (« Solutio Ringer-Locke pro injectionibus»).

1.2 По внешнему виду препарат представляет собой стерильную, апиrogenную, прозрачную бесцветную жидкость без механических включений.

1.3 В 100,0 см³ в качестве действующих веществ содержится 0,8 г натрия хлорида, 0,02 г калия хлорида, 0,02 г кальция хлорида, 0,02 г натрия гидрокарбоната, 0,1 г глюкозы, а в качестве вспомогательного вещества вода для инъекций.

1.4 Препарат выпускают в стеклянных флаконах объемом 100,0 и 200,0 см³ или в стеклянных бутылках объемом 400,0 см³.

1.5 Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 С до плюс 25 С.

Срок годности препарата – 2 года от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения и транспортировки.

Фармакологические свойства

2.1 Препарат изотоничен плазме крови животных, регулирует водно-солевое и кислотно-щелочное равновесие в организме животных.

2.2 После введения лекарственное средство быстро всасывается с места инъекции и распределяется в органах и тканях животного.

2.3 Препарат не токсичен и не вызывает раздражающего действия на ткани.

Порядок применения препарата

3.1 Препарат назначают животным внутривенно при диспепсиях и других заболеваниях, сопровождающихся обезвоживанием и интоксикацией организма, при кровопотерях, для промывания ран и глаз.

Используют также для растворения различных лекарственных препаратов.

3.2 Препарат применяют в следующих дозах внутривенно (см³):

- лошадям и крупному рогатому скоту 1000,0 – 3000,0,
- мелким жвачным 100,0 – 300,0,
- телятам до одного года 200,0 – 400,0, ягнятам и поросятам 25,0 – 100,0.

3.3 При применении препарата в рекомендованных дозах в соответствии с инструкцией побочные реакции и осложнения не наблюдаются.

3.4 Противопоказаний к применению препарата не установлено.

3.5 Животноводческую продукцию после применения препарата можно использовать без ограничений.

Меры предосторожности

4.1 Все работы с препаратом необходимо проводить в спецодежде.

4.2 Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

4.3 После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией.

При подтверждении выявления отрицательно воздействия препарата на организм животного ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

Полное наименование производителя

6.1 Частное производственное унитарное предприятие «Гомельский завод ветеринарных препаратов» (246013, г. Гомель, пер. Технический, 1; тел./факс 8(0232)39-10-00)